



Templates

Overzicht

April 2026

Inhoud

Procestemplates	4
Algemeen	4
Organisatie specifiek	6
Medi-Mere	6
Dokter Drenthe.....	7
Huisartsenpost Eemland	7
NEO Huisartsenzorg	7
Overig	8
Diagnosetemplates	9
Allergie en hooikoorts.....	9
Anticonceptie	9
Armklasten.....	9
Been, knie, heup	9
Braken.....	9
Brandwonden	10
Buikklachten	10
Diabetes.....	10
Duizeligheid.....	11
Eczeem	11
Geslachtsziektes	11
Hoesten	12
Hoofdpijn	12
Huidklachten.....	12
Insectenbeten	15
Keelpijn	16
Koorts	16
Kortademigheid	17
Medicatievragen	17
Nekklachten (kinderen)	17
Oogklachten.....	17
Oorklachten	18
Pijn op de borst.....	18
Plasklachten.....	18
Psychische klachten (volwassenen).....	19
Rug-, nek- en schouderklachten (volwassenen)	19

Rugklachten (kinderen)	20
Sinusitis	20
Vaginale klachten, ongesteld, de overgang.....	20
Vallen, stoten en kneuzingen	20
Vermoeidheid	21
Wonden.....	21
Wratten	22
Overige medisch inhoudelijke templates	22

Procestemplates

Algemeen

Advies contact diëtist
Advies contact fysiotherapeut
Afsluiten consult - algemeen
Afsluiten consult - doktersassistent
Afsluiten consult – ENG
Afsluiten consult - huisarts
Afsluiten consult – Spreekuur.nl
Afsluiten consult– geen reactie patiënt Spreekuur.nl (na 30 min) (K)
Afsluiten consult– geen reactie patiënt Spreekuur.nl (na 30 min) (V)
Algemeen contactadvies - Spreekuur.nl (V)
Apotheek – algemeen (ANW)
Apotheek – algemeen (DAG)
Assistente toevoegen aan chat
Beoordeling SEH – informed consent patiënt (K)
Beoordeling SEH – informed consent patiënt (V)
Bloeddrukmeten bij klachten
Diagnose– LEEG (K)
Diagnose– LEEG(V)
Doktersassistent toevoegen in chat – afspraak maken
Formulier voor bloedprikken – digitaal versturen (V)
Formulier voor bloedprikken – ophalen bij de praktijk (V)
Fysieke afspraak nodig - afspraak maken via patiëntenportaal (V)
Fysiek consult dagpraktijk (DAG)
Fysiek consult HAP - informed consent patiënt (K)
Fysiek consult HAP - informed consent patiënt (V)
Fysiek consult HAP - informed consent patiënt (V) - ENG
Geen bijzonderheden bloedsuitslag (DAG)
Geen reactie
Geen reactie - ENG
Geen reactie - consult wordt einde dag afgesloten
Geen spoed – eigen huisarts (ANW)
Glucosebepaling op praktijk
Hb-bepaling praktijk (DAG)(V)
Huisarts niet aanwezig (DAG)
Huisarts toevoegen in chat
Huisarts toevoegen in chat - ENG
Informatie geven
Jaarlijkse controle CVRM (POH/HA)
Link zelf afspraak inplannen via MGN (DAG)
Link zelf herhaalmedicatie aanvragen via MGN (DAG)
LSP / medisch dossier inzien (K)
LSP / medisch dossier inzien (V)
Medicatie ophalen - apotheek stuurt bericht (V)
Medicatievoorschrift
Medicijnen op reis
Meekijken huisarts
Meekijken huisarts - ENG
Nierfunctiebeoordeling (bloed en urine bij start medicatie) via e-mail
Nierfunctiebeoordeling (bloed en urine bij start medicatie) via formulier assistent
Nierfunctiebeoordeling (bloed en urine jaarlijks) via e-mail
Nierfunctiebeoordeling (bloed en urine jaarlijks) via formulier assistent (geen e-mailadres bekend)
Niet geven geneeskundige verklaring

Opnieuw foto sturen
Overdragen consult - huisarts (ANW)
Overdragen consult – triagist/doktersassistent (ANW)
Patiënt in het buitenland
Patiënt niet ingeschreven bij praktijk (DAG)(V)
Persoonsgegevens kind
Samenvatting na videoconsult
Spoed tussendoor - even wachten en vangnet
Sputumkweek
Test crp (ANW)
Test CRP (ANW)
Urine op kweek
Verkeerde gegevens consult - volwassenen vragenlijst
Verkeerde gegevens consult - kind vragenlijst
Verkeerde gegevens consult - voor iemand anders ingestuurd
Videobellen Spreekuur.nl (direct)
Videobellen Spreekuur.nl (direct) - ENG
Videobellen Spreekuur.nl (inplannen)
Welkom – AIOS
Welkom – ander klachtgebied – basisarts(V)
Welkom – basisarts
Welkom – doktersassistent - ENG
Welkom – doktersassistente (ANW)(K)
Welkom – doktersassistente (ANW)(V)
Welkom – doktersassistente (DAG)(K)
Welkom – doktersassistente (DAG)(V)
Welkom – druk HAP + sms versturen – huisarts - ENG
Welkom – druk HAP 15 min + sms versturen - AIOS (K)
Welkom – druk HAP 15 min + sms versturen - AIOS (V)
Welkom – druk HAP 15 min + sms versturen – basisarts (K)
Welkom – druk HAP 15 min + sms versturen – basisarts (V)
Welkom – druk HAP 15 min + sms versturen – doktersassistent (ANW)(K)
Welkom – druk HAP 15 min + sms versturen – doktersassistent (ANW)(V)
Welkom – druk HAP 15 min + sms versturen - huisarts (ANW)(K)
Welkom – druk HAP 15 min + sms versturen - huisarts (ANW)(V)
Welkom – druk HAP 15 min + sms versturen – verpleegkundig specialist (K)
Welkom – druk HAP 15 min + sms versturen – verpleegkundig specialist (V)
Welkom – druk HAP 30 min + sms versturen - AIOS (K)
Welkom – druk HAP 30 min + sms versturen - AIOS (V)
Welkom – druk HAP 30 min + sms versturen – basisarts (K)
Welkom – druk HAP 30 min + sms versturen – basisarts (V)
Welkom – druk HAP 30 min + sms versturen – doktersassistent (ANW)(K)
Welkom – druk HAP 30 min + sms versturen – doktersassistent (ANW)(V)
Welkom – druk HAP 30 min + sms versturen - huisarts (ANW)(K)
Welkom – druk HAP 30 min + sms versturen - huisarts (ANW)(V)
Welkom – druk HAP 30 min + sms versturen – verpleegkundig specialist (K)
Welkom – druk HAP 30 min + sms versturen – verpleegkundig specialist (V)
Welkom – druk HAP 60 min + sms versturen - AIOS (K)
Welkom – druk HAP 60 min + sms versturen - AIOS (V)
Welkom – druk HAP 60 min + sms versturen – basisarts (K)
Welkom – druk HAP 60 min + sms versturen – basisarts (V)
Welkom – druk HAP 60 min + sms versturen – doktersassistent (ANW)(K)
Welkom – druk HAP 60 min + sms versturen – doktersassistent (ANW)(V)
Welkom – druk HAP 60 min + sms versturen - huisarts (ANW)(K)
Welkom – druk HAP 60 min + sms versturen - huisarts (ANW)(V)
Welkom – druk HAP 60 min + sms versturen – verpleegkundig specialist (K)
Welkom – druk HAP 60 min + sms versturen – verpleegkundig specialist (V)

Welkom – druk HAP 90 min + sms versturen - huisarts (ANW)(V)
Welkom – druk HAP 90 min + sms versturen - huisarts (ANW)(K)
Welkom – druk HAP 90 min + sms versturen – doktersassistent (ANW)(V)
Welkom – druk HAP 90 min + sms versturen – doktersassistent (ANW)(K)
Welkom – extra informatie - AIOS
Welkom – extra informatie - basisarts
Welkom – extra informatie - doktersassistent - ENG
Welkom – extra informatie - doktersassistent
Welkom – extra informatie – huisarts - ENG
Welkom – extra informatie – huisarts (ANW)
Welkom – extra informatie – verpleegkundig specialist
Welkom – herhaalmedicatie (patiënt wijzen op MGN route) (DAG)
Welkom – huisarts - ENG
Welkom - huisarts - oppakken binnen 24u (DAG)(K)
Welkom - huisarts - oppakken binnen 24u (DAG)(K) - ENG
Welkom - huisarts - oppakken binnen 24u (DAG)(V)
Welkom – triagist i.s.m. huisarts (ANW)
Welkom – verpleegkundig specialist
Welkom + sms versturen – doktersassistent (DAG)
Welkom– ander klachtgebied – AIOS(K)
Welkom– ander klachtgebied – AIOS(V)
Welkom– ander klachtgebied – basisarts(K)
Welkom– ander klachtgebied – doktersassistent (V)
Welkom– ander klachtgebied – doktersassistent(K)
Welkom– ander klachtgebied – huisarts (K)
Welkom– ander klachtgebied – huisarts (V)
Welkom– ander klachtgebied – verpleegkundig specialist (K)
Welkom– ander klachtgebied – verpleegkundig specialist (V)
Welkom– huisarts - met voorstellen(DAG)(K)
Welkom– huisarts - met voorstellen(DAG)(V)
Welkom– huisarts - zonder voorstellen (DAG)(K)
Welkom– huisarts - zonder voorstellen(DAG)(V)
Welkom– huisarts (ANW)(K)
Welkom– huisarts (ANW)(V)
Wachttijdbemiddeling door zorgverzekeraar - ziekenhuis of kliniek (V)
Wachttijdbemiddeling door zorgverzekeraar - GGZ (V)
Wachttijdbemiddeling door zorgverzekeraar - ziekenhuis of kliniek (K)
Wachttijdbemiddeling door zorgverzekeraar - GGZ (K)
Verwijzing naar specialist of ziekenhuis via ZorgDomein (V)
Verwijzing naar specialist of ziekenhuis via ZorgDomein (K)
Zelf afspraak maken via Spreekuur.nl (DAG)
Zelf herhaalmedicatie aanvragen via Spreekuur.nl (DAG)
Zelf afspraak maken via Uwzorgonline (DAG)
Zelf herhaalmedicatie aanvragen via Uwzorgonline (DAG)

Organisatie specifiek

Medi-Mere

Welkom – diëtist
Welkom – extra informatie - diëtist
Welkom – fysiotherapeut
Welkom – extra informatie - fysiotherapeut
Verwijzing fysiotherapie – Medi-Mere (V)
Verwijzing diëtist – Medi-Mere (V)
Welkom en link thuisarts.nl - Medi-Mere

Psychische klachten / POH-GGZ - Medi-Mere
Verwijzing wijkteams - Medi-Mere
Informatie labonderzoek - Medi-Mere
Voorkeur Spreekuur.nl - Medi-Mere
Welkom – diëtist - ENG
Welkom – extra informatie - diëtist - ENG
Welkom – fysiotherapeut - ENG
Welkom – extra informatie - fysiotherapeut - ENG
Verwijzing fysiotherapie – Medi-Mere (V) - ENG
Verwijzing diëtist – Medi-Mere (V) - ENG
Welkom en link thuisarts.nl - Medi-Mere - ENG
Psychische klachten / POH-GGZ - Medi-Mere - ENG
Verwijzing wijkteams - Medi-Mere - ENG
Informatie labonderzoek - Medi-Mere – ENG
Voorkeur Spreekuur.nl – Medi-Mere - ENG

Dokter Drenthe

Welkom – herhaalrecept – huisarts – Dokter Drenthe
Apotheek Assen
Apotheek Emmen
Apotheek Meppel
Apotheek Hoogeveen
SEH – Assen - Dokter Drenthe
SEH – Meppel – Dokter Drenthe
SEH – Hoogeveen – Dokter Drenthe
SEH – Emmen - Dokter Drenthe
Test crp - Dokter Drenthe
Fysiek consult HAP - locatie en tijdstip afspraak - Assen
Fysiek consult HAP - locatie en tijdstip afspraak - Emmen
Fysiek consult HAP - locatie en tijdstip afspraak - Meppel
Fysiek consult HAP - locatie en tijdstip afspraak - Hoogeveen
Test crp - Dokter Drenthe
Welkom - triagist - Dokter Drenthe (ANW)

Huisartsenpost Eemland

Apotheek Barneveld (za 9:30 – 12.00)
Apotheek Meander
Apotheek Meander - ENG
Deelname patiëntenpanel - huisartsenspoedpost Eemland
Fysiek consult HAP - locatie en tijdstip afspraak - Amersfoort
Fysiek consult HAP - locatie en tijdstip afspraak - Amersfoort - ENG
SEH – Gelderse Vallei Ede
SEH Meander Amersfoort
Test urine - HAP Eemland (V)
Test urine - HAP Eemland (V) - ENG

NEO Huisartsenzorg

Dienstapothek CWZ Nijmegen
Radboudapothek Nijmegen
Dienstapothek Maasheggen – geopend 08.30-23.00u
SEH – CWZ Nijmegen
SEH – Maasziekenhuis
SEH – UMCN Radboud
SEH – Maartenskliniek
SEH – Rijnstate

Verwijzing tandartsenpost – CWZ Nijmegen
Fysiek consult HAP - locatie en tijdstip afspraak - Nijmegen
Fysiek consult HAP - locatie en tijdstip afspraak - Boxmeer

Overig

Welkom apotheker Castrovalva
Link zelf herhaalmedicatie aanvragen via UwZorgOnline – Hohmann en de Vet
Link zelf afspraak inplannen via uwzorgonline – Hohmann en de Vet
Welkom - doktersassistent - Huisartsencentrum Axel
Afsluiten consult indien geen vragen - doktersassistent - Huisartsencentrum Axel
Afsluiten consult indien geen vragen - doktersassistent - Huisartsencentrum Axel - ENG
Geen reactie - doktersassistent - Huisartsencentrum Axel
Afsluiten consult - doktersassistent - Huisartsencentrum Axel
Herhaalmedicatie - doktersassistent - Huisartsencentrum Axel
Onduidelijke hulpvraag - doktersassistent - Huisartsencentrum Axel

Diagnosetemplates

Allergie en hooikoorts

Allergie – andere medicijnen (K)
Allergie – andere medicijnen (V)
Allergie eigen huisdier – advies antihistaminica (DAG)(K)
Allergie eigen huisdier – advies antihistaminica (DAG)(V)
Allergische rhinitis – fluticason neusspray - 4-12 jaar - 50 µg/dosis(K)
Allergische rhinitis – fluticason neusspray 50 µg/dosis(V)
Hooikoorts/pollenallergie – advies antihistaminica (DAG)(K)
Hooikoorts/pollenallergie – advies antihistaminica (DAG)(V)
Hooikoorts/pollenallergie – advies antihistaminica (DAG)(V) – ENG

Anticonceptie

≥24 uur te laat gestart na stopweek (vanaf dag 1)(V)
≥2x combinatiepil vergeten–week 1 (dag 2 - 7)(V)
≥2x combinatiepil vergeten–wk 3 en daarna bij continu gebruik (vanaf dag 15)(V)
1x combinatiepil vergeten >12u na vaste tijd–2e t/m 21e pil(V)
2x achter elkaar combinatiepil vergeten–week 2 (dag 8 -14)(V)
3x combinatiepil vergeten–week 2 (dag 8 -14)(V)
Algemene uitleg anticonceptie
Anticonceptie - dochter starten met de pil (K)
Keuze hormoonspiraal - Mirena, Levosert of Kyleena (V)
Plaatsen hormoonspiraal (V)
Plaatsen koperspiraal (V)
Starten met de pil (V)

Armlachten

Arm- en schouderklachten algemeen - advies(K)
Arm- en schouderklachten algemeen – advies(V)
Arm- en schouderklachten algemeen – advies(V) - ENG

Been, knie, heup

Artrose - algemeen advies (V)
Artrose knie - advies (V)
Gewrichtsontsteking–advies pijnstilling conform pijnstandaard(V)
Jichtartritis–colchicine 0,5 mg(stap 2)(V)
Jichtartritis–diclofenac 50 mg (stap 1)(V)
Jichtartritis–prednisolon 30 mg (stap 1)(V)
Reactieve artritis–advies(V)
Reactieve artritis–diclofenac 50 mg(V)
Trauma knie–advies pijnstilling en koelen(V)
Trauma knie–koelen-diclofenac 50 mg(V)
Verdenking DVT–apixaban 5 mg–echo morgen(DAG)(V)
Verdenking DVT–volgende werkdag echo-start apixaban 5mg(ANW)(V)

Bloedneus

Bloedneus op dit moment - advies (V)
Bloedneus op dit moment - advies (K)
Vaker een bloedneus, niet op dit moment - advies (V)
Vaker een bloedneus, niet op dit moment - advies (K)

Braken

Braken-advies(K)
Braken-advies(V)
Braken-metoclopramide 10 mg (zetpil)(V)
Braken-ORS(K)
Braken-ORS(V)
Reflux / overgeven / braken – advies (K)
Zwangerschapsmisselijkheid of braken - advies (V)

Brandwonden

Brandwond eerstegraads-advies(K)
Brandwond eerstegraads-advies(V)
Brandwond eerstegraads-advies(V) - ENG
Brandwond geïnfecteerd-fusidinecrème(K)
Brandwond geïnfecteerd-fusidinecrème(V)
Brandwond moeilijk verbindbare plek-flammazine(K)
Brandwond moeilijk verbindbare plek-flammazine(V)
Brandwond tweedegraads (oppervlakkig) met blaren-advies(K)
Brandwond tweedegraads met blaren-advies(V)
Brandwond tweedegraads met blaren-advies(V) – ENG

Buikklachten

Aambeien / hemorroïden - advies (V)
Buikpijn – advies (K)
Buikpijn - advies (K) - ENG
Buikpijn - LO en urine inleveren (DAG) (V)
Buikpijn (geen koorts)-advies(V)
Buikpijn en diarree (<70 jaar)-advies(V)
Buikpijn en diarree (≥70 jaar)-advies(V)
Buikpijn en diarree (≥70 jaar)-advies(V) - ENG
Buikpijn en diarree (risico op) dehydratie (<70 jaar)-ORS(V)
Buikpijn en diarree (risico op) dehydratie (<70 jaar)-ORS(V) - ENG
Buikpijn en diarree (risico op) dehydratie (≥70 jaar)-ORS(V)
Diarree – advies ORS(K)
Diarree (risico op) dehydratie (≥70 jaar)-ORS(V) - ENG
Diarree-advies loperamide (<70 jaar)(let op contra-indicaties)(V)
Fissura ani / anale fissuur - advies(K)
Maagklachten / zuurbranden / maagzuur – advies (V)
Maagklachten / zuurbranden / maagzuur – maagzuur-binder (V)
Obstipatie – advies en bisacodyl (V)
Obstipatie – advies en lactulose/macrogol (V)
Obstipatie – advies en micro-klysma (V)
Obstipatie – advies en lactulose/macrogol (V) - ENG
Obstipatie- advies lactulose/macrogol (K)
Vermoeden buikgriep-advies(V)
Wormpjes/parasiet in poep/ontlasting - advies(K)

Diabetes

Hyperglykemie >15mmol/l en klachten – 2-4-6 regel insuline (V)
Hyperglykemie tot 20mmol/l en geen klachten – advies drinken (V)
Hypoglykemie >3,5 mmol/l – advies (V)
Hypoglykemie >3,5 mmol/l – dosering aanpassen bij insuline en tabletten (V)

Duizeligheid

Duizeligheid - advies (K)
Duizeligheid – algemeen - advies (V)
Duizeligheid – algemeen - advies (V) – ENG
Duizeligheid - vertigo training (V)
Duizeligheid / BPPD - advies(V)
Duizeligheid / BPPD - uitleg Eply-manoeuvre(V)
Neuritis vestibularis / duizeligheid - advies (V)

Eczeem

Constitutioneel eczeem – advies (V)
Constitutioneel eczeem – klasse 1 corticosteroid- hydrocortisonzalf 10 mg/g(V)
Constitutioneel eczeem – klasse 2 corticosteroid - triamcinoloncreme 1 mg/g(V)
Constitutioneel eczeem – klasse-3 corticosteroid- betamethason 1 mg/g(V)
Constitutioneel eczeem–advies indifferente zalf(K)
Constitutioneel eczeem–advies indifferente zalf(K) - ENG
Constitutioneel eczeem–matig eczeem(stap 2) triamcinolonacetonidecrème 0,1%(K)
Constitutioneel eczeem–matig eczeem(stap 2) triamcinolonacetonidecrème 0,1%(K) - ENG
Constitutioneel eczeem–matig eczeem-hydrocortisonacetaat 10 mg/ml(K)
Constitutioneel eczeem–matig eczeem-hydrocortisonacetaat 10 mg/ml(K) - ENG
Luiereczeem/luieruitslag–advies miconazolcrème(K)
Luiereczeem/luieruitslag–advies zinkzalf/-olie(K)
Ontstoken constitutioneel eczeem – fusidinezuur 20 mg/g(V)
Psoriasis – advies (V)
Psoriasis – huid (niet gezicht of plooien) - (stap 1) klasse 3 betamethasonzalf 1 mg/g(V)
Psoriasis – dikke schilferlaag huid - (stap 0) salicylzuur zalf 100 mg/g(V)
Psoriasis (gelaat en/of lichaamplooien) - (stap 2) calcipotriol zalf 50 µg/g en triamcinolon zalf (V)
Psoriasis (gezicht of plooien) – (stap 1) klasse 2 triamcinolonzalf 1 mg/g(V)
Psoriasis behaarde hoofdhuid – koolteer shampoo (denorex)(V)
Psoriasis hoofdhuid – calcipotriol lotion 50 µg/g en klasse-3 hydrocortison lotion (V)
Psoriasis hoofdhuid – dikke schilferlagen – salicylzuurzalf + kolteershampoo (V)
Psoriasis hoofdhuid – klasse-3 hydrocortison betamethason lotion 1 mg/g(V)
Psoriasis hoofdhuid – klasse-4 clobetasol lotion 0,5 mg/g(V)
Psoriasis huid (niet gelaat of plooien) – (stap 2) calcipotriol zalf en klasse-3 betamethasonvaleraatzalf 1mg/g(V)
Psoriasis huid (niet gelaat/plooien) – (stap 3) klasse-4 clobetasol 0,5 mg/g(V)
Seborroïsch eczeem – advies (V)
Seborroïsch eczeem gezicht – ketoconazol crème 20 mg/g(V)
Seborroïsch eczeem hoofdhuid – ketoconazol shampoo 20 mg/g(V)

Geslachtsziektes

Genitale wratten – keuze behandeling podofyllotoxine crème 1,5 mg/g(vrouwen)(V)
Genitale wratten – keuze afwachtend beleid (man)(V)
Genitale wratten – keuze afwachtend beleid (vrouw)(V)
Genitale wratten – keuze behandeling podofyllotoxine crème 1,5 mg/g(mannen)(V)
Genitale wratten – mannen – keuze behandeling (V)
Genitale wratten – vrouwen - keuze behandeling (V)
Mpox-apepokkenvirus kweek (V)
Soatest: chlamydia – geen klachten en geen risicogroep (mannen)(V)
Soatest: chlamydia – geen klachten en geen risicogroep (vrouwen)(V)
Soatest: chlamydia – klachten man en geen risicogroep (V)
Soatest: chlamydia / gonorrhoe / trichomonas – vaginale klachten en geen risicogroep, wel soarisico (vrouwen)(V)
Soatest: chlamydia, gonorrhoe, syfilis, HIV, hepB – risicogroep met klachten (vrouwen)(V)

Soatest: chlamydia, gonorrhoe, syfilis, HIV, hepB – risicogroep met klachten (mannen)(V)
Soatest: chlamydia, gonorrhoe, syfilis, HIV, hepB – risicogroep zonder klachten (vrouwen)(V)
Soatest: chlamydia, gonorrhoe, syfilis, HIV, hepB – risicogroep zonder klachten (mannen)(V)
Soatest: chlamydia, gonorrhoe, syfilis, HIV, hepB en hepC - MSM die PREP gebruiken (man)(V)

Hoesten

COVID-19 positief - advies (V)
COVID-19 positief - advies (K)
Hoesten – advies (<2 jaar)(K)
Hoesten – advies (≥ 2 jaar)(K)
Hoesten – advies (V)
Hoesten – advies (V) - ENG
Hoesten - hyperreactiviteit/mogelijk astma – Salbutamol diskus 200 µg/dosis(V)
Hoesten – Salbutamol aerosol 100 µg/d(K)
Hoesten – Salbutamol aerosol 100 µg/dosis(V)
Hoesten – salbutamol diskus - ≥ 7 jaar - 200 µg/d(K)
Kinkhoest – 4 wkn – 1 jaar - advies en azitromycine 40 mg/ml(K)
Kinkhoest – advies ≥ 1 jaar (K)
Pseudokroep – advies (K)
Pseudokroep – dexamethason 1 mg/ml(dosering 0,2mg/kg)(K)
Stoppen met roken - advies doorsturen naar online roken consulent (V)
Stoppen met roken - advies afspraak POH (V)
Stoppen met roken - advies (V)

Hoofdpijn

Clusterhoofdpijn – verwijzing neuroloog – informed consent (V)
Hoofdpijn – advies pijnstilling en hoofdpijndagboek - nadere analyse eigen HA (ANW)(V)
Hoofdpijn – dagboek bijhouden – controle medicijnen (DAG)(V)
Hoofdpijndagboek bijhouden – soort hoofdpijn (DAG)(V)
Medicatie-overgebruikshoofdpijn (MOH) pijnstilling – advies stoppen met medicatie (V)
Migraine – aanvalsbehandeling sumatriptan 50 mg – let op contra-indicaties (V)
Migraine – advies aanvalsbehandeling combinatie paracetamol ibuprofen, sumatriptan (V)
Migraine – advies stappen aanvalsbehandeling paracetamol - ibuprofen (V)
Migraine – keuze behandeling (DAG)(V)
Migraine – onderhoudsbehandeling candesartan 4 mg(V)
Migraine – onderhoudsbehandeling metoprolol 100 mg retard(V)
Spanningshoofdpijn – advies en pijnstilling (V)
Spanningshoofdpijn – amitriptyline 10 mg(DAG)(V)

Huidklachten

Acne – advies (K)
Acne – advies (K) - ENG
Acne – benzoylperoxide 5% zelfzorg (stap 1)(K)
Acne – benzoylperoxide 5% zelfzorg (stap 1)(K) - ENG
Acne – clindamycine lotion 1% (stap 2)(K)
Acne – clindamycine lotion 1% (stap 2)(K) - ENG
Acne – doxycycline 100 mg(stap 3)(K)
Acne – doxycycline 100 mg(stap 3)(K) - ENG
Acne – tretinoïne crème 0,05% - vitamine D preparaat (stap 1)(K)
Acne–advies(V)
Acne–advies(V) - ENG
Acne–benzoylperoxide 5% zelfzorg(stap 1)(V)
Acne–benzoylperoxide 5% zelfzorg(stap 1)(V) - ENG
Acne–clindamycine lotion 1% (stap 2)(V)
Acne–clindamycine lotion 1% (stap 2)(V) - ENG

Acne–doxycycline 100 mg(stap 3)(V)
Acne–doxycycline 100 mg(stap 3)(V) - ENG
Acne–tretinoïne crème 0,05%/vitamine D preparaat(stap 1)(V)
Aften - zelfzorgadvies en pijnstilling lidocaïne (V)
Aften - zelfzorgadvies en pijnstilling lidocaïne >6mnd (K)
Aften - zelfzorgadvies <6mnd (K)
Droge huid - advies (V)
Droge huid - advies (K)
Droge huid - advies (K) - ENG
Erysipelas / wondroos-flucloxacilline 500 mg, 10 dagen(V)
Erysipelas / wondroos-flucloxacilline 500 mg, 10 dagen(V) - ENG
Erysipelas/wondroos–advies(V)
Erysipelas/wondroos–advies(V) - ENG
Erythrasma – advies en miconazol (V)
Erythrasma – claritromycine eenmalig (V)
Erythrasma – fusidinezuurcrème (V)
Furunkel / steenpuist – advies(V)
Furunkel / steenpuist - advies(V) - ENG
Furunkel / steenpuist – flucloxacilline 7 dagen, 500 mg 4 dd (V)
Furunkel / steenpuist - flucloxacilline 7 dagen, 500 mg 4 dd (V) - ENG
Ganglion - advies (V)
Hand-voet-mondziekte - advies(K)
Hand-voet-mondziekte - advies(K) – ENG
Herpes simplex / herpes labialis / koortslip – advies (K)
Herpes simplex / herpes labialis / koortslip – advies zinkoxide/zinksulfaat (K)
Herpes simplex / herpes labialis / koortslip – advies zinkoxide/zinksulfaat (K) - ENG
Herpes simplex/herpes labialis/koortslip–advies(V)
Herpes simplex / herpes labialis / koortslip – advies zinkoxide/zinksulfaat(V)
Herpes simplex / herpes labialis / koortslip – advies zinkoxide/zinksulfaat(V) - ENG
Herpes Zoster / gordelroos – advies (K)
Herpes Zoster / gordelroos – advies (K) - ENG
Herpes Zoster/gordelroos–aciclovir 800 mg, 7 dagen(V)
Herpes Zoster/gordelroos–advies(V)
Herpes Zoster/gordelroos–advies(V) - ENG
Herpes Zoster/gordelroos–valaciclovir 500 mg, 7 dagen(V)
Herpes Zoster/gordelroos–valaciclovir 500 mg, 7 dagen(V) - ENG
Hevige lokale reactie - advies antihistaminica(V)
Hevige lokale reactie - advies antihistaminica(V) - ENG
Impetigo / krentenbaard – advies (K)
Impetigo / krentenbaard – advies (K) - ENG
Impetigo / krentenbaard – flucloxacilline 250/500 mg capsules, 40mg/kg/dag(K)
Impetigo / krentenbaard – flucloxacilline 250/500 mg capsules, 40mg/kg/dag(K) - ENG
Impetigo / krentenbaard – fusidinezuurcrème 20 mg/ml(K)
Impetigo/krentenbaard–advies(V)
Impetigo/krentenbaard–advies(V) - ENG
Impetigo/krentenbaard–flucloxacilline 500 mg(V)
Impetigo/krentenbaard–flucloxacilline 500 mg(V) - ENG
Impetigo/krentenbaard–fusidinezuurcrème(V)
Ingegroeide teennagel - keuze behandeling door podotherapeut of pedicure(V)
Intertrigo / smetplekken – advies(V)
Jeuk - algemeen advies (V)
Jeuk - algemeen advies (V) - ENG
Paronychia/nagelriemontsteking–amoxicilline met clavulaanzuur 500/125 mg, 7 dagen(V)
Paronychia/nagelriemontsteking–vinger advies(V)
Pityriasis rosea – advies (K)
Pityriasis rosea–advies(V)
Pityriasis rosea–advies(V) - ENG

Pityriasis versicolor / tinea versicolor / zomergist – > 12 jaar - itraconazol capsules 100 mg(K)
 Pityriasis versicolor / tinea versicolor / zomergist – advies zelfzorg en seleensulfide / miconazol (K)
 Pityriasis versicolor / tinea versicolor / zomergist – advies zelfzorg en seleensulfide / miconazol (K) - ENG
 Pityriasis versicolor/tinea versicolor/zomergist–advies zelfzorg en seleensulfide/miconazol(V)
 Pityriasis versicolor/tinea versicolor/zomergist–advies zelfzorg en seleensulfide/miconazol(V) - ENG
 Pityriasis versicolor/tinea versicolor/zomergist–itraconazol capsules 100 mg, 7 dagen(V)
 Psoriasis – advies (K)
 Ringworm / huidschimmel / tinea corporis - medicatie terbinafine (V)
 Ringworm / huidschimmel / tinea corporis - zelfzorg met antischimmel crème (K)
 Ringworm / huidschimmel / tinea corporis - zelfzorg met antischimmel crème (K) - ENG
 Ringworm / huidschimmel / tinea corporis - zelfzorg met antischimmel crème (V)
 Ringworm / huidschimmel / tinea corporis - zelfzorg met antischimmel crème (V) - ENG
 Schimmelnagels - itraconazol voor vingernagels (V)
 Schimmelnagels - keuze behandeling (K)
 Schimmelnagels - keuze behandeling (V)
 Schimmelnagels - keuze behandeling (V) - ENG
 Schimmelnagels - nagellak met miconazol (V)
 Schimmelnagels - terbinafine voor teennagels (V)
 Schimmelnagels - terbinafine voor teennagels (V) - ENG
 Schurft / scabiës - 1e keus permitrine-kwetsbare ouderen(V)
 Schurft / scabiës - <12 jaar - 1e keus permitrine 7,5-15 g (1/4 tot 1/2 tube)(K)
 Schurft / scabiës - <2 maanden-1e keus benzylbenzooat 25% FNA 250 mg/g(K)
 Schurft / scabiës - ≥12 jaar - 1e keus permitrine tot 30 g (1 tube)(K)
 Schurft / scabiës - 2 maanden - 12 jaar - 2e keus benzylbenzooat 25% FNA 250 mg/g(V)
 Schurft / scabiës - 2e keus benzylbenzooat 25% FNA 250 mg/g-kwetsbare ouderen(V)
 Schurft / scabiës - ivermectine eenmalig 200 µg/kg(V)
 Schurft / scabiës - ivermectine eenmalig 200 µg/kg(V) - ENG
 Schurft / scabiës – vanaf 16 jaar - 1e keus permitrine(V)
 Schurft / scabiës - vanaf 16 jaar - 1e keus permitrine(V) - ENG
 Schurft / scabiës – vanaf 16 jaar - 2e keus benzylbenzooat 25% FNA 250 mg/g(V)
 Schurft / scabiës - vanaf 16 jaar - 2e keus benzylbenzooat 25% FNA 250 mg/g(V) - ENG
 Schurft / scabiës - ≥12 jaar - 2e keus benzylbenzooat 25% FNA 250 mg/g(K)
 Spruw - <4 maanden - nystatine gel(K)
 Spruw - <4 maanden - nystatine gel(K) - ENG
 Spruw - ≥4 maanden - miconazol gel(K)
 Spruw - advies(K)
 Spruw - advies(K) - ENG
 Urticaria / netelroos – Kinderen 1-6 jaar - desloratadine drank 0,5 mg/ml(K) - ENG
 Urticaria / netelroos – advies kinderen <2 jaar (K)
 Urticaria / netelroos – advies kinderen <2 jaar (K) - ENG
 Urticaria / netelroos – advies kinderen >2 jaar (K)
 Urticaria / netelroos – advies kinderen >2 jaar (K) - ENG
 Urticaria/netelroos–desloratadine 5 mg(V) - ENG
 Urticaria / netelroos – Kinderen > 6 jaar - levocetirizine 5 mg(K)
 Urticaria / netelroos – Kinderen >13 jaar - desloratadine 5 mg(K)
 Urticaria / netelroos – Kinderen 1-6 jaar - desloratadine drank 0,5 mg/ml(K)
 Urticaria / netelroos – Kinderen 2-6 jaar - levocetirizine 0,5 mg/ml(K)
 Urticaria / netelroos – Kinderen 6-12 jaar - desloratadine 5 mg(K)
 Urticaria / netelroos (K) – 6mnd – 1 jaar - desloratadine drank 0,5 mg/ml - ENG
 Urticaria / netelroos– ≥ 12 jaar desloratadine 5 mg(K) - ENG
 Urticaria / netelroos(K) – 6 – 11 jaar - desloratadine 5 mg(K) - ENG
 Urticaria/netelroos (zwanger)–loratadine 10 mg, 14 dagen(V)
 Urticaria/netelroos–advies(V)
 Urticaria/netelroos–advies(V) - ENG
 Urticaria/netelroos–desloratadine 5 mg(V)
 Urticaria/netelroos–levocetirizine 5 mg(V)
 Urticaria/netelroos – levocetirizine 5 mg(V) - ENG

Vijfde ziekte - advies(K)

Voetschimmel / zwemmerseczeem / tinea pedis – > 12 jaar - terbinafine 250 mg(K)

Voetschimmel / zwemmerseczeem / tinea pedis – terbinafinecrème (K)

Voetschimmel/ zwemmerseczeem / tinea pedis – advies miconazol op de huid (K)

Voetschimmel / zwemmerseczeem / tinea pedis – advies miconazol op de huid (K) - ENG

Voetschimmel / zwemmerseczeem / tinea pedis – advies miconazol op de huid(V)

Voetschimmel / zwemmerseczeem / tinea pedis – advies miconazol op de huid(V) - ENG

Voetschimmel/zwemmerseczeem/tinea pedis–terbinafinecrème zelfzorg(V)

Voetschimmel/zwemmerseczeem/tinea pedis–terbinafinetabletten (mannen)(V)

Voetschimmel/zwemmerseczeem/tinea pedis–terbinafinetabletten (vrouwen)(V)

Vulvovaginale candidiasis/candida vagina/vaginale schimmelinfectie–advies(V)

Vulvovaginale candidiasis/candida vagina/vaginale schimmelinfectie–advies(V) - ENG

Vulvovaginale candidiasis/candida vagina/vaginale schimmelinfectie–clotrimazol crème of capsules(zelfzorg)(V)

Vulvovaginale candidiasis / candida vagina / vaginale schimmelinfectie – clotrimazol crème of capsules(zelfzorg) (V) - ENG

Vulvovaginale candidiasis/candida vagina/vaginale schimmelinfectie–fluconazol eenmalig 150mg(V)

Vulvovaginale candidiasis/candida vagina/vaginale schimmelinfectie–fluconazol eenmalig 150mg(V) - ENG

Waterpokken - advies - jonger dan 12 jaar (K)

Waterpokken - advies - jonger dan 12 jaar (K) - ENG

Waterpokken - advies - vanaf 12 jaar (K)

Waterwratjes / Mollusca contagiosa - advies (K)

Wondinfectie – > 10 jaar feneticilline 500 mg capsules(K)

Wondinfectie – >10 jaar feneticilline 500 mg capsules(K) - ENG

Wondinfectie – 2-10 jaar - feneticilline 250 mg(K)

Wondinfectie – 2-10 jaar - feneticilline 250 mg(K) - ENG

Wondinfectie – advies (K)

Wondinfectie / ontsteking – advies (K)

Wondinfectie / ontsteking – fusidinezuurcrème (K)

Wondinfectie / ontsteking – fusidinezuurcrème (K) - ENG

Wond infectie– <2 jaar- feneticilline 25 mg/ml(K)

Wondinfectie/ontsteking–advies(V)

Wondinfectie/ontsteking–advies(V) - ENG

Wondinfectie/ontsteking–fusidinezuurcrème(V)

Wondinfectie/ontsteking–fusidinezuurcrème(V) - ENG

Wondinfectie-feneticilline 500 mg, 7 dagen (V)

Wondinfectie-feneticilline500mg,7dagen(V) - ENG

Zonneallergie - advies(K)

Zonneallergie - advies(V)

Zonneallergie - triamcinolonacetonidecrème(V)

Insectenbeten

Eikenprocessierups–advies(K)

Eikenprocessierups–advies(V)

Insectenbeet – antihistamine (V) - ENG

Insectenbeet algemeen–advies en zelfzorg antihistamine (V)

Insectenbeet algemeen–advies en zelfzorg antihistamine (V) - ENG

Insectenbeet algemeen–advies en zelfzorg antihistamine >1 jaar(K)

Insectenbeet algemeen–advies en zelfzorg antihistamine >1 jaar(K) - ENG

Insectenbeet algemeen–advies(K)

Insectenbeet algemeen–advies(K) - ENG

Insectenbeet algemeen–advies(V)

Insectenbeet algemeen–advies(V) – ENG

Tekenbeet /teek–<24 uur vastgezeteten advies(K)

Tekenbeet/teek– <72 azitromycine ant.prof., overgevoeligheid doxy(V)

Tekenbeet/teek- <24 uur nog verwijderen (V)
Tekenbeet/teek- <24 uur vastgezetten advies(V)
Tekenbeet/teek- <72 keuze doxycycline ant.prof.(V)
Tekenbeet/teek >24 uur en <72 uur-keuze behandelwijze(K)
Tekenbeet/teek >24 uur en <72 uur-keuze behandelwijze(K) - ENG
Tekenbeet/teek >24 uur en <72-keuze om af te wachten(K)
Tekenbeet/teek >72 uur-advies(K)
Tekenbeet/teek 24-72 uur keuze om af te wachten(V)
Tekenbeet/teek 24-72 uur-keuze behandelwijze(V)
Tekenbeet/teek 24-72 uur-keuze behandelwijze(V) - ENG
Tekenbeet/teek –jonger dan 8 jaar, preventief azitromycine drank 10 mg/kg(K)
Tekenbeet/teek/ Lyme/erythema migrans–vanaf 8 jaar en >40kg-doxycycline 100 mg(K)
Tekenbeet/teek/Lyme–<8 jaar-amoxicilline drank 50 mg/kg(K)
Tekenbeet/teek/Lyme–amoxicilline (zwangeren 2e/3e trimester of overgevoeligheid doxy)(V)
Tekenbeet/teek/Lyme–azitromycine 500 mg–overgevoeligheid amoxi en doxy(V)
Tekenbeet/teek/Lyme-doxycycline 100 mg(V)
Tekenbeet/teek–vanaf 8 jaar >30 kg en <40 kg preventief doxycycline 100 mg(K)
Tekenbeet/teek–vanaf 8 jaar en <30 kg preventief doxycycline 100 mg(K)
Tekenbeet/teek–vanaf 8 jaar en >40 kg, preventief doxycycline 100 mg(K)
Tekenbeet–teek nog te verwijderen <24 uur(K)

Keelpijn

Keelpijn – <2 jaar - feneticilline drank 25 mg/ml(K)
Keelpijn – <2 jaar - feneticilline drank 25 mg/ml(K) - ENG
Keelpijn – > 10 jaar - feneticilline 500 mg(K)
Keelpijn – 2 - 10 jaar - feneticilline 250 mg(K)
Keelpijn – advies (K)
Keelpijn – advies (roker)(K)
Keelpijn – advies (roker)(K) - ENG
Keelpijn en Pfeiffer – bloedonderzoek (K)
Keelpijn en Pfeiffer – bloedonderzoek (K) - ENG
Keelpijn– verdenking peritonsillair infiltraat/uitblijven resultaat 1e kuur, augmentin(V)
Keelpijn– verdenking peritonsillair infiltraat/uitblijven resultaat 1e kuur, augmentin(V) - ENG
Keelpijn–advies (roker)(V)
Keelpijn–advies (roker)(V) - ENG
Keelpijn–advies(V)
Keelpijn–advies(V) - ENG
Keelpijn–azitromycine, penicilline-allergie(V)
Keelpijn–feneticilline(V)
Keelpijn–feneticilline(V) - ENG
Roodvonk – advies (K)

Koorts

Koorts – advies(V)
Koorts – advies(V) - ENG
Koorts –advies(K)
Koorts-advies(K) - ENG
Koorts na vaccinatie–advies(K)
Koortsstuip –advies(K)
Uitdroging/dehydratie – ORS en ondansetron drank eenmalig 0,1 mg/kg lichaamsgewicht, max. 8 mg - 3 mnd-18 jaar(K)
Uitdroging/dehydratie–ORS(K)
Zesde ziekte - ≥3 maanden - advies(K)

Kortademigheid

Kortademig/benauwd–advies(V)
Kortademig/benauwd–advies(V) - ENG
Kortademig/benauwd–benauwd na corona(ANW)(V)
Kortademig/benauwd–hyperventilatie(ANW)(V)
Kortademig / benauwd - luchtweginfectie advies (K)
Kortademig/benauwd–matige longaanval prednison 40 mg, 5 dagen(V)
Kortademig/benauwd–salbutamol aerosol(V)
Kortademig/benauwd–salbutamol diskus(V)
Kortademig/benauwd–salbutamol diskus(V) - ENG
Kortademig/benauwd–verwijzing eigen HA(ANW)(V)

Medicatievragen

Bijwerking medicatie–ernstig(ANW)(V)
Bijwerking medicatie–onschuldig(V)
Herhaalrecept (ANW)(V)
Herhaalrecept (DAG)(V)
Herhaalrecept (DAG)(V) – ENG
Medicatie combineren geen probleem

Nekklachten (kinderen)

Nekklachten algemeen - advies(K)

Oogklachten

Blefaritis–advies (en instructiefilmpje)(K)
Blefaritis–advies en kunsttranen (en instructiefilmpje)(K)
Blefaritis–advies en kunsttranen (en instructiefilmpje)(V)
Blefaritis–advies(en instructiefilmpje)(V)
Blefaritis–advies(en instructiefilmpje)(V) - ENG
Conjunctivitis allergie–advies cromoglicinezuur vanaf 2 jaar(K)
Conjunctivitis allergie–advies indifferente oogdruppels, zelfzorg(V)
Conjunctivitis allergie–advies(K)
Conjunctivitis allergie–advies(K) - ENG
Conjunctivitis allergie–allergodil-azelastine 0,5 mg/ml(stap 1)(V)
Conjunctivitis allergie–antihistaminetabletten zelfzorg(V)
Conjunctivitis allergie–antihistaminetabletten zelfzorg(V) - ENG
Conjunctivitis allergie–olopatadine 1 mg/ml(stap 2)(V)
Conjunctivitis allergie–prednisolon oogdruppels 5 mg/ml(stap 3)(V)
Conjunctivitis allergie–prednisolon oogdruppels 5 mg/ml(stap 3)(V) - ENG
Conjunctivitis infectie–advies oogdruppels of -gel(K)
Conjunctivitis infectie–advies oogdruppels of -gel(V)
Conjunctivitis infectie–chlooramfenicol druppels 5 mg/ml(K)
Conjunctivitis infectie–chlooramfenicol oogdruppels 5 mg/ml(V)
Conjunctivitis infectie–chlooramfenicol oogzalf 10 mg/g(K)
Conjunctivitis infectie–chlooramfenicol oogzalf 10 mg/g(V)
Gezwellen oog – antihistaminetabletten zelfzorg(V)
Hordeolum / strontje– >2 wk veel klachten-chlooramfenicol oogdruppels 5 mg/ml(V)
Hordeolum /strontje – advies (V) - ENG
Hordeolum/strontje–advies(K)
Hordeolum/strontje–advies(K) - ENG
Hordeolum/strontje–advies, <2 wk klachten(V)
Hordeolum/strontje–advies, <2 wk klachten(V) - ENG
Subconjunctivale bloeding–advies(K)
Subconjunctivale bloeding–advies(K) - ENG

Subconjunctivale bloeding–advies(V)
Subconjunctivale bloeding–advies(V) - ENG

Oorklachten

Loopoor – advies (K)
Loopoor > 7 dagen - hydrocortison/colistine/bacitracine met trommelvliesbuisjes (K)
Loopoor >7 dagen, zonder trommelvliesbuisjes - <1 jaar - amoxicilline 25 mg/ml (dagdosering 40 mg/kg)(K)
Loopoor >7 dagen, zonder trommelvliesbuisjes - 1-7 jaar - amoxicilline 50 mg/ml (dagdosering 40 mg/kg)(K)
Loopoor >7 dagen, zonder trommelvliesbuisjes - 8-11 jaar - amoxicilline tablet 375 mg(dagdosering 40 mg/kg)(K)
Loopoor >7 dagen, zonder trommelvliesbuisjes - ≥ 12 jaar - amoxicilline tablet 500 mg(dagdosering 40 mg/kg)(K)
Oorklachten / dicht oor - oren uitspuiten (V)
Oorklachten / dicht oor zonder verkoudheid - advies (V)
Oorpijn / oorklachten - advies (V)
Oorsuizen / tinnitus - advies (V)
Otitis externa / ontsteking gehoorgang – advies (K)
Otitis externa / ontsteking gehoorgang – advies (K) - ENG
Otitis externa /ontsteking gehoorgang – flucloxacilline 500 mg en oordruppels (V)
Otitis externa /ontsteking gehoorgang – flucloxacilline drank 25mg/ml, 40 mg/kg (K)
Otitis externa /ontsteking gehoorgang – flucloxacilline drank 25mg/ml, 40 mg/kg (K) - ENG
Otitis externa / ontsteking gehoorgang - hydrocortison 1% FNA oordruppels (V)
Otitis externa /ontsteking gehoorgang – zure oordruppels (hydrocortison 1%)(K)
Otitis media acuta / middenoorontsteking - <1 jaar - amoxicilline 25 mg/ml (dagdosering 40 mg/kg)(K)
Otitis media acuta / middenoorontsteking - <1 jaar - amoxicilline 25 mg/ml (dagdosering 40 mg/kg)(K) - ENG
Otitis media acuta / middenoorontsteking - 1-7 jaar - amoxicilline 50 mg/ml (dagdosering 40 mg/kg)(K)
Otitis media acuta / middenoorontsteking - 1-7 jaar - amoxicilline 50 mg/ml (dagdosering 40 mg/kg)(K) - ENG
Otitis media acuta / middenoorontsteking - 8-11 jaar - amoxicilline tablet 375 mg(dagdosering 40 mg/kg)(K)
Otitis media acuta / middenoorontsteking - 8-11 jaar - amoxicilline tablet 375 mg(dagdosering 40 mg/kg)(K) - ENG
Otitis media acuta / middenoorontsteking - ≥ 12 jaar - amoxicilline tablet 500 mg(dagdosering 40 mg/kg)(K)
Otitis media acuta / middenoorontsteking - ≥ 12 jaar - amoxicilline tablet 500 mg(dagdosering 40 mg/kg)(K) - ENG
Otitis media acuta / middenoorontsteking – advies (K)
Otitis media acuta / middenoorontsteking – advies (K) - ENG

Pijn op de borst

Hartkloppingen/palpitaties–advies(V)
Hartkloppingen/palpitaties–atriumfibrilleren/boezemfibrilleren nieuw (ANW)(V)
Hartkloppingen/palpitaties–atriumfibrilleren/boezemfibrilleren nieuw(V)
Hartkloppingen/palpitaties–hartritmestoornissen/paroxismale tachycardie (ANW)(V)
Hartkloppingen/palpitaties–hartritmestoornissen/paroxismale tachycardie(V)
Hartkloppingen–al bekend–extra metoprolol(V)
Hartkloppingen–metoprolol 50 mg MGA(V)
Pijn op de borst/pijn thorax–borstkas symptomen(V)
Pijn op de borst/pijn thorax–maagklachten(V)
Pijn op de borst/pijn thorax–verwijzing eigen HA (ANW)(V)

Plasklachten

Mictieklachten mannen – advies (V)

Test urine / urineonderzoek - tijdstip inleveren aangeven - uitslag via Spreekuur.nl (ANW)(K)
 Test urine / urineonderzoek - tijdstip inleveren aangeven - uitslag via Spreekuur.nl(ANW)(V)
 Test urine / urineonderzoek - tijdstip inleveren aangeven (ANW)(V)
 Test urine / urineonderzoek – uitslag via Spreekuur.nl (DAG)(K)
 Test urine / urineonderzoek – uitslag via Spreekuur.nl (DAG)(V)
 Test urine / urineonderzoek - zo snel mogelijk inleveren - uitslag via Spreekuur.nl (ANW)(K)
 Test urine / urineonderzoek - zo snel mogelijk inleveren - uitslag via Spreekuur.nl(ANW)(V)
 Test urine / urineonderzoek - zo snel mogelijk inleveren - uitslag via Spreekuur.nl(ANW)(V) - ENG
 Test urine / urineonderzoek - zo snel mogelijk inleveren (ANW)(V)
 Test urine / urineonderzoek (DAG)(K)
 Test urine / urineonderzoek (DAG)(V)
 Test urine uitstellen tot ochtend (ANW)(V)
 Urine-incontinentie - stress-incontinentie - advies en optie pessarium(V)
 Urine-incontinentie - urge-incontinentie - advies(V)
 Urineweginfectie / Cystitis – nitrofurantoïne tablet 50 mg(K)
 Urineweginfectie / Cystitis – 1e keus - gezond, nitrofurantoïne 100 mg(mannen)(V)
 Urineweginfectie / Cystitis - advies (K)
 Urineweginfectie / Cystitis - advies (K) - ENG
 Urineweginfectie / Cystitis– advies (V)
 Urineweginfectie / Cystitis – advies (V) - ENG
 Urineweginfectie / Cystitis – amoxicilline/clavulaanzuur drank (K)
 Urineweginfectie / Cystitis – nitrofurantoïne drank (K)
 Urineweginfectie / Cystitis – uitslag urinetest negatief (K)
 Urineweginfectie / Cystitis - uitslag urinetest negatief (K) - ENG
 Urineweginfectie / Cystitis – weefselinvasie - amoxicilline/clavulaanzuur tablet 500/125 mg, 10 dagen(K)
 Urineweginfectie / Cystitis – weefselinvasie - cotrimoxazol drank, 10 dagen (K)
 Urineweginfectie / Cystitis – weefselinvasie - cotrimoxazol tablet 480 mg, 10 dagen (K)
 Urineweginfectie / Cystitis (frequente mictie/aandrang) – uitslag urinetest negatief (V)
 Urineweginfectie / Cystitis (pijnlijke mictie) – uitslag urinetest negatief (V)
 Urineweginfectie / Cystitis 2e keus - gezond, niet zwanger – fosfomycine 3 g(vrouwen)(V)
 Urineweginfectie / Cystitis gezond 2e keus – trimethoprim 300 mg(mannen)(V)
 Urineweginfectie / Cystitis gezond, niet zwanger – nitrofurantoïne 100 mg(vrouwen)(V)
 Urineweginfectie / Cystitis –weefselinvasie 2e keus amoxicilline/clavulaanzuur 625 mg(vrouwen)(V)
 Urineweginfectie / weefselinvasie - cystitis – 1e keus ciprofloxacin 500 mg(mannen)(V)
 Urineweginfectie / weefselinvasie - cystitis – 1e keus ciprofloxacin 500 mg(vrouwen)(V)
 Urineweginfectie / weefselinvasie - cystitis – 2e keus amoxiclavulaanzuur 625 mg(mannen)(V)
 Urineweginfectie- Cystitis /diabetes/nierafwijkingen/verminderde weerstand/zwanger – nitrofurantoïne 100 mg(vrouwen)(V)

Psychische klachten (volwassenen)

Paniekaanval – advies (V)
 Paniekaanval – advies (V) – ENG
 Psychische klachten – algemeen advies (ANW)(V)
 Psychische klachten – algemeen advies (ANW)(V) – ENG
 Psychische klachten - contact eigen behandelaar (V)

Rug-, nek- en schouderklachten (volwassenen)

Arm- en schouderklachten algemeen – advies(K)
 Bewegingsapparaat algemeen – pijnstilling diclofenac 50 mg(V)
 Lage rugpijn met uitstraling– advies (V)
 Lage rugpijn met uitstraling– advies (V) - ENG
 Lage rugpijn met uitstraling – diclofenac 50 mg(V)
 Lage rugpijn met uitstraling – diclofenac 50 mg(V) - ENG
 Lage rugpijn met uitstraling – amitriptyline 25 mg(V)

Lage rugpijn zonder uitstraling– advies (V)
Lage rugpijn zonder uitstraling– advies (V) - ENG
Lage rugpijn zonder uitstraling – diclofenac 50 mg(V)
Lage rugpijn zonder uitstraling – tramadol 50 mg(V)
Lage rugpijn zonder uitstraling – tramadol 50 mg(V) - ENG
Nekklachten zonder uitstraling– advies (V)
Schouderklachten/bovenrug zonder uitstraling – advies (V)

Rugklachten (kinderen)

Rugklachten algemeen - advies(K)

Sinusitis

Sinusitis/holteontsteking - >2 wk klachten of 3-4x per jaar–budesonide neusspray 100 µg/dosis(V)
Sinusitis/holteontsteking–advies(V)
Sinusitis/holteontsteking–amoxicilline tablet 500 mg(V)

Vaginale klachten, ongesteld, de overgang

Onregelmatige ongesteldheid / menstruatie - start met de pil (K)
Onregelmatige ongesteldheid / menstruatie - start met de pil (V)
Overgangsklachten - advies en verwijzing naar keuzehulp (V)
Overgangsklachten - advies(V)
Overgangsklachten - vrouwen met baarmoeder, peri- postmenopauzaal - estradiolpleisters en dydrogesteron 10mg (V)
Overgangsklachten - vrouwen met baarmoeder, peri- postmenopauzaal - estradioltabletten 1 mg en dydrogesteron 10 mg(V)
Overgangsklachten - vrouwen zonder baarmoeder - estradiol 1mg (V)
Pijnlijke menstruatie / ongesteldheid - advies (K)
Pijnlijke menstruatie / ongesteldheid – advies (V)
Uitstellen ongesteldheid / menstruatie – gebruikt combinatiepil(V)
Uitstellen ongesteldheid / menstruatie – gebruikt hormoonring/hormoonpleisters(V)
Uitstellen ongesteldheid / menstruatie – lynestrenol / progestageen 5 mg(V)
Vaginale afscheiding - advies (K)
Vaginale afscheiding – advies (V)
Veel bloedverlies bij ongesteldheid / menstruatie – advies (K)

Vallen, stoten en kneuzingen

Elleboog–instructiefilmpje drukverband(K)
Elleboog–instructiefilmpje drukverband(V)
Enkel–instructiefilmpje drukverband en Thuisartslink(K)
Enkel–instructiefilmpje drukverband en Thuisartslink(V)
Hoofdtrauma - aanhoudende klachten 6wkn-3mnd (V)
Hoofdtrauma - aanhoudende klachten >3mnd - verwijzing revalidatie (V)
Hoofdtrauma-advies(K)
Hoofdtrauma-advies(V)
Hoofdtrauma-wekadvis - <16 jaar(K)
Hoofdtrauma-wekadvis - ≥16 jaar(V)
Kneuzing - morgen eigen arts (ANW)(K) - ENG
Kneuzing - morgen eigen arts (ANW)(V) - ENG
Kneuzing algemeen–advies koelen, drukverband en pijnstilling(K)
Kneuzing algemeen–advies koelen, drukverband en pijnstilling(K) - ENG
Kneuzing algemeen–advies koelen, drukverband en pijnstilling(V)
Kneuzing algemeen–advies koelen, drukverband en pijnstilling(V) - ENG
Kneuzing met verdenking fractuur–maandag eigen huisarts/koelen en drukverband (ANW)(K)
Kneuzing met verdenking fractuur–morgen eigen huisarts/koelen en drukverband (ANW)(K)

Kneuzing met verdenking fractuur–morgen eigen huisarts/koelen en drukverband (ANW)(K) - ENG
 Knie–instructiefilmpje drukverband en Thuisartslink(K)
 Knie–instructiefilmpje drukverband en Thuisartslink(V)
 Malletvinger–instructiefilmpje tijdelijke spalk(K)
 Malletvinger–instructiefilmpje tijdelijke spalk (ANW)(V)
 Malletvinger–instructiefilmpje vinger(spalk) schoonmaken(K)
 Malletvinger–instructiefilmpje vinger(spalk) schoonmaken(V)
 Pols–instructiefilmpje drukverband(K)
 Pols–instructiefilmpje drukverband(V)
 Teen/tenen - buddytape (V) - ENG
 Teen/tenen–instructiefilmpje buddytape(K)
 Teen/tenen–instructiefilmpje buddytape(V)
 Trauma gebit: afgebroken melktand–advies(K)
 Trauma gebit: afgebroken tand definitief gebit–advies(K)
 Trauma gebit: afgebroken tand–advies(V)
 Trauma gebit: uitgeslagen melktanden/melktanden uit de mond door andere oorzaak–advies(K)
 Trauma gebit: uitgeslagen tanden/tanden definitief gebit uit de mond door andere oorzaak–advies(K)
 Trauma gebit: uitgeslagen tanden/tanden uit de mond door andere oorzaak–advies(V)
 Verdenking fractuur - beoordeling op de HAP (V)
 Verdenking fractuur–beoordeling HAP-informed consent patiënt (ANW)(K)
 Verdenking fractuur–beoordeling HAP-informed consent patiënt(V)
 Verdenking fractuur–beoordeling SEH-informed consent patiënt (ANW)(K)
 Verdenking fractuur–beoordeling SEH-informed consent patiënt(V)
 Verdenking fractuur–maandag eigen huisarts/koelen en drukverband(V)
 Verdenking fractuur–morgen eigen huisarts/koelen en drukverband(V)
 Verstuipte enkel–advies drukverband en pijnstilling(K)
 Verstuipte enkel–advies drukverband en pijnstilling(K) - ENG
 Verstuipte enkel–advies drukverband en pijnstilling(V)
 Verstuipte enkel–advies drukverband en pijnstilling(V) - ENG
 Vinger /vingers - buddytape (V) - ENG
 Vinger/vingers–instructiefilmpje buddytape(K)
 Vinger/vingers–instructiefilmpje buddytape(V)

Vermoeidheid

Vermoeidheid - advies (V)
 Vermoeidheid - advies (V) – ENG

Wonden

Bijtwond – diep - hand/voet/mens of kattenbeet - tetanusvaccinatie niet nodig amoxicilline/clavulaanzuur 40 mg/kg/dag, 5 dagen (K)
 Bijtwond – tetanusvaccinatie nodig - amoxicilline/clavulaanzuur 625 mg(V)
 Bijtwond – tetanusvaccinatie niet nodig - amoxicilline/clavulaanzuur 625 mg(V) - ENG
 Bijtwond – tetanusvaccinatie niet nodig - amoxicilline/clavulaanzuur 625 mg(V)
 Bijtwond – verminderde weerstand extra TIG en vaccinatie - amoxicilline/clavulaanzuur 40 mg/kg/dag, 5 dagen (K)
 Schaafwond–advies, tetanusvaccinatie niet nodig(K)
 Schaafwond – advies, tetanusvaccinatie niet nodig (V)
 Schaafwond – advies, tetanusvaccinatie nodig (V)
 Skin tear / scheurwond – instructiefilmpje vetgaas – tetanusvaccinatie niet nodig (ANW)(V)
 Skin tear / scheurwond – instructiefilmpje vetgaas – tetanusvaccinatie nodig (ANW)(V)
 Snij- of scheurwond – advies hechtstrips – tetanusvaccinatie (en instructiefilmpje)(V)
 Snij- of scheurwond – advies hechtstrips – tetanusvaccinatie niet nodig (en instructiefilmpje)(V)
 Snij- of scheurwond – advies hechtstrips – tetanusvaccinatie niet nodig (en instructiefilmpje)(V) - ENG
 Snij- of scheurwond–advies en instructiefilm hechtstrips, tetanusvaccinatie niet nodig(K)
 Tetanusvaccinatie – afspraak ingepland (DAG)(V)

Tetanusvaccinatie – uitslag via Spreekuur.nl (DAG)(V)
Tetanusvaccinatie (DAG)(V)
Tetanusvaccinatie HAP (ANW)(V)
Wond – advies en instructiefilmpje wond verbinden met vettig gaas – tetanusvaccinatie niet nodig (V)
Wond–advies en instructiefilmpje wond verbinden met vettig gaas, tetanusvaccinatie niet nodig(K)
Wond – advies en instructiefilmpje wond verbinden met vettig gaas – tetanusvaccinatie nodig (V)

Wratten

Wratten–advies en zelfzorg salicylzuur of bevroren(K)
Wratten–advies zelfzorg salicylzuur en bevroren(V)
Wratten–keuze afwachten, salicylzuur 40% of bevroren op praktijk(K)
Wratten–keuze afwachten, salicylzuur 40% of bevroren op praktijk(V)
Wratten–keuze bevrozing op praktijk met afspraak(K)
Wratten–keuze bevrozing op praktijk met afspraak(V)
Wratten–keuze bevrozing op praktijk wrattenspreekuur zonder afspraak(V)
Wratten–keuze patiënt bevrozing op praktijk wrattenspreekuur zonder afspraak(K)
Wratten–keuze patiënt salicylzuurzalf 40%(K)
Wratten–keuze salicylzuurzalf 40%(V)

Overige medisch inhoudelijke templates

Flauwvallen / bewusteloos / orthostatische klachten (V)
Informatie gordelroos vaccinatie (V)
Niet stoppen met bloedverdunners voor ingreep (V)
Obesitas - leefstijladvies en informatie GLI (V)
Pijnstilling algemeen ibuprofen - 3 mnd tot 18 jaar(K)
Pijnstilling algemeen NSAID – 18+ jaar(V)
Pijnstilling algemeen paracetamol – 18+ jaar(V)
Pijnstilling algemeen paracetamol – 3 mnd tot 18 jaar(K)
Slaapproblemen - advies (V)
Slaapproblemen - slaapdagboek (V)
Spanning of stress voor examen – advies en propranolol (V)
Spanning of stress voor examen – advies (K)
Stoppen bloedverdunners voor ingreep - contact trombosediens (V)
Stoppen met antistolling voor ingreep - doac (V)
Stoppen bloedverdunners voor ingreep - contact eigen behandelaar (V)